

ЗАДАЧИ

к курсу "Мат. логика и алгоритмы" (2008)

1. Докажите разрешимость множества всех четных чисел.
 2. Докажите, что если f – вычислимая (частичная) функция из \mathbb{N} в \mathbb{N} , то область определения и множество значений f перечислимы.
 3. Докажите, что формула Даммета $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ истинна в линейно упорядоченных моделях Крипке, но невыводима в \mathcal{IL} .
 4. Пусть T – полная теория с равенством, имеющая конечную модель. Докажите, что T не имеет бесконечных моделей.
 5. Докажите, что сложение натуральных чисел является вычислимой функцией.
 6. Докажите, что формула $p \rightarrow \neg\neg p$ является теоремой \mathcal{IL} .
 7. Докажите, что тождественная функция, заданная на словах конечного алфавита, вычислима.
 8. Докажите разрешимость одноэлементного множества натуральных чисел.
 10. Докажите, что не существует теории первого порядка в сигнатуре $\{+, \cdot, =, 0, 1\}$, моделями которой являются в точности все конечные поля. Аналогично -- для полей ненулевой характеристики.
 11. Постройте формулу 1-го порядка без равенства, имеющую 2-элементную модель, но не имеющую 1-элементных моделей.
 12. Переведите текст в логическую символику (в подходящей сигнатуре) и постройте конечную модель полученной теории:
Существуют по крайней мере две прямые. Каждая прямая содержит более одной точки. Через любые 2 различные точки проходит ровно одна прямая. Прямые параллельны тогда и только тогда, когда они не имеют общих точек. Через любую точку, не лежащую на данной прямой, проходит ровно одна прямая, параллельная данной.
 13. Постройте формулу 1-го порядка без равенства, имеющую 3-элементную модель, но не имеющую 2-элементных моделей.
 14. Докажите, что формула
$$\neg(p \vee q) \rightarrow \neg p \wedge \neg q$$
является теоремой \mathcal{CL} .
 15. Докажите, что пустое множество слов в конечном алфавите разрешимо.
 16. Используя теорему о полноте, докажите, что формула $\neg(p \vee q) \rightarrow \neg p \wedge \neg q$ является теоремой \mathcal{IL} .
-

17. Докажите, что формула

$\forall x \exists y P(x,y) \rightarrow \exists y \forall x P(x,y)$ невыводима в исчислении предикатов.

18. Пусть

$\varphi_n := \forall x_1 \dots \forall x_n \exists x_0 (x_0 \neq x_1 \wedge \dots \wedge x_0 \neq x_n)$ (при $n > 0$)

Докажите, что теория $T = \{\varphi_n \mid n > 0\}$ полна (в сигнатуре с одним символом $=$).

19. Докажите, что если $\vdash_{\text{CL}} A$, то $\vdash_{\text{IL}} \neg\neg A$ (теорема Гливенко).

20. Докажите, что композиция вычислимых всюду определенных функций из \mathbf{N} в \mathbf{N} вычислима.

21. Докажите, что элементарная теория поля \mathbf{Q} в сигнатуре $\{+, \cdot, =, 0, 1\}$ не является счетно категоричной.
